

תוכן העניינים:

3	פרק 1
3	מבוא לאגברה
3	מספרים מכוונים :
3	סיכום כללי :
4	שאלות :
6	חזקות ושורשים עם מספרים מכוונים :
6	סיכום כללי :
7	שאלות :
7	סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים :
7	סיכום כללי :
8	שאלות :
8	שברים פשוטים ועשרוניים :
8	סיכום כללי :
9	אחוזים :
9	שאלות :
12	כפל וחילוק שברים :
12	סיכום כללי :
12	שאלות :
13	חיבור חיסור שברים :
13	סיכום כללי :
14	שאלות :
16	בעיות יסודיות באחוזים :
16	סיכום כללי :
16	שאלות :
17	חזרה על תבניות מספר :
17	סיכום כללי :
17	שאלות :
18	כינוס איברים :
18	סיכום כללי :
19	שאלות :
20	פישוט ביטויים ע"י פתיחת סוגריים :
20	סיכום כללי :
20	שאלות :

- 21..... פישוט ביטויים באמצעות נוסחאות הכפל המקוצר :
21..... סיכום כללי :
22..... שאלות :
23..... פירוק לגורמים של ביטויים אלגבריים :
23..... סיכום כללי :
23..... שאלות :
25..... פירוק הטרינום :
25..... סיכום כללי :
25..... שאלות :
26..... שברים אלגבריים :
26..... סיכום כללי :
27..... שאלות :
28..... כפל וחילוק של שברים אלגבריים :
28..... סיכום כללי :
29..... שאלות :
29..... חיבור וחסור של שברים אלגבריים :
29..... סיכום כללי :
30..... שאלות :
32..... שברים כפולים :
32..... סיכום כללי :
32..... שאלות :
33..... תשובות סופיות :

פרק 1

מבוא לאלגברה

מספרים מכוונים:

סיכום כללי:

מספרים מכוונים הם מספרים שיכולים לקבל סימן חיובי או שלילי, כגון:

- בקניון גדול ישנן קומות 1, 2, 3, 4, וכן חניונים הממוקמים בקומות 1-, 2-, ו-3-.
- גובה פני הים מוגדר להיות 0 מטרים. העיר חיפה נמצאת כ-103 מטרים מעל פני הים בעוד שים המלח נמצא בגובה 426- מטרים.

כללים:

- כאשר מחברים שני מספרים בעלי סימנים זהים, מחברים את המספרים עצמם והסימן נשאר.
- כאשר מחברים שני מספרים בעלי סימנים מנוגדים, מחסירים את המספרים זה מזה (הקטן מהגדול) וסימן התוצאה כסימן המספר הגדול מביניהם.
- כפל וחילוק יתבצע בשני חלקים:
 - ביצוע הפעולה על המספרים עצמם.
 - קביעת הסימן של התוצאה באופן הבא:
 - כפל או חילוק של שני מספרים בעלי אותו סימן - התוצאה תהיה חיובית.
 - כפל או חילוק של שני מספרים שונים סימן - התוצאה תהיה שלילית.


הערה:

אם יש רצף של מכפלות (או חילוקים), סימן התוצאה תלוי במספר הפעמים שבהם מופיע סימן שלילי (-). אם הסימן מופיע מספר זוגי של פעמים התוצאה חיובית, ואם הוא מופיע מספר אי-זוגי של פעמים אזי התוצאה שלילית.

שאלות:

(1) סמנו את המספרים הבאים על ציר המספרים בהתאמה:

$$-3\frac{1}{2}, 4, 1\frac{1}{3}, -5, -\frac{1}{2}, 2, 0, \frac{1}{2}, -2$$



(2) חשבו את ערכי הביטויים הבאים:

א. $3+2$	ב. $-3-2$
ג. $3-2$	ד. $-3+2$
ה. $-1-4$	ו. $7+10$
ז. $-6+5$	ח. $-7+3$

(3) חשבו את ערכי הביטויים הבאים:

א. $5+7-23+1$	ב. $5-8-12+17$
ג. $3-14+2+6$	ד. $-4-11+2+9$
ה. $6-21+3-7$	ו. $-7-13+5-3$

(4) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

א. $4 \cdot 9$	ב. $4 \cdot (-7)$
ג. $(-6) \cdot (-5)$	ד. $(-5) \cdot (-3)$
ה. $(-2) \cdot 8$	ו. $(-8) \cdot 5$
ז. $(-2) \cdot (-3) \cdot (-3)$	ח. $2 \cdot 3 \cdot 3$
ט. $(-2) \cdot 3 \cdot (-3)$	י. $(-2) \cdot (-3) \cdot 3$
יא. $2 \cdot 3 \cdot (-3)$	יב. $(-2) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-2)$
יג. $(-1) \cdot (-2) \cdot (-4) \cdot 2$	יד. $1 \cdot (-2) \cdot (-4) \cdot 2$

5) מהו הסימן של תוצאת המכפלה בכל מקרה :

א. $(-2) \cdot (-4) \cdot (-3) \cdot (-10) \cdot (-6) \cdot (-5)$

ב. $(-1) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (-3) \cdot (-10) \cdot 6 \cdot (-5)$

ג. $(-1) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (-3) \cdot (-10) \cdot (-6) \cdot (-5)$

ד. $(-1) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (-3) \cdot (-10) \cdot 6 \cdot 5$

6) חשבו את ערכי הביטויים הבאים :

ב. $(-30) : 3$

א. $(-25) : (-5)$

ד. $(-32) : (-4)$

ג. $40 : (-10)$

ו. $4 : (-16)$

ה. $(-6) : 18$

7) חשבו את ערכי הביטויים הבאים :

ב. $\frac{42}{-6}$

א. $\frac{-60}{12}$

ד. $\frac{-12}{-3}$

ג. $\frac{32}{-4}$

8) מה התוצאה של כל אחת מהפעולות הבאות :

ב. $(-2) \cdot 0$

א. $0 : 5$

ד. $6 : 0$

ג. $0 \cdot (-3) \cdot 4$

ו. $0 - 4$

ה. $0 + 4$

חזקות ושורשים עם מספרים מכוונים:

סיכום כללי:

הגדרה:

פעולת החזקה היא צורה מקוצרת שמייצגת פעולת כפל של אותו מספר בעצמו מספר פעמים. סימון החזקה הוא באופן הבא:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$$

כאשר a נקרא הבסיס ו- n נקראת החזקה.

הערות:

- כאשר הבסיס חיובי, התוצאה תמיד תהיה חיובית ללא קשר האם החזקה היא זוגית או אי-זוגית.
- כאשר הבסיס שלילי, התוצאה תהיה חיובית אם החזקה היא זוגית ושלילית אם החזקה היא אי-זוגית.

הגדרה:

פעולת השורש היא הפוכה לפעולת החזקה והיא מאפשרת למצוא את בסיס החזקה. סימון השורש הוא באופן הבא:

$$\sqrt[n]{a}$$

כאשר a נקרא הבסיס ו- n נקרא סדר השורש.

הערות:

- שורש למספר חיובי יכול להיות מסדר זוגי או אי-זוגי.
- שורש למספר שלילי יכול להיות מסדר אי-זוגי בלבד.

שאלות:

9) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

- | | |
|--------------|---------------|
| א. 3^2 | ב. 3^3 |
| ג. $(-3)^3$ | ד. $(-2)^3$ |
| ה. 4^3 | ו. 3^4 |
| ז. $(-5)^3$ | ח. 10^4 |
| ט. $-(-3)^4$ | י. -5^4 |
| יא. -4^3 | יב. $-(-2)^6$ |

10) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| א. $\sqrt[3]{-27}$ | ב. $\sqrt[4]{625}$ |
| ג. $\sqrt[4]{-16}$ | ד. $\sqrt[5]{-32}$ |
| ה. $-\sqrt[4]{81}$ | ו. $-\sqrt[3]{1000}$ |

סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים:

סיכום כללי:

סדר פעולות חשבון:

- פעולות כפל וחילוק קודמות לפעולות חיבור וחסור.
- פעולות חזקה ושורש קודמות לפעולות כפל וחילוק.
- סוגריים קודמים לכל.

שאלות:

11) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

- א. $\sqrt{81} + 3 \cdot 2^3 - 40 : 8$
- ב. $(-3)^2 : 9 - 2 \cdot (-4^2)$
- ג. $\sqrt{144} - 20 : 4 + 3 \cdot (-2)^2$
- ד. $3 + 4 \cdot [-3 + 4 \cdot (-2)] + \sqrt{10 + 6}$
- ה. $(-3)^4 : (-9) - 5 \cdot (-2)^3$
- ו. $-\sqrt{9} + 5^2 : (-4 - 1) - 24 : 12 \cdot 3$
- ז. $-2^5 : (-8) + 4^2 - 3 \cdot 5$
- ח. $\sqrt[3]{-27} + 4 \cdot 3^2 - 2 \cdot 3^3$
- ט. $[6 \cdot (-1)^4 - 10 \cdot (-1)^3] \cdot (-1)^5$
- י. $(8 - \sqrt[3]{64}) \cdot (2 \cdot (-4) - \sqrt[3]{243})$
- יא. $\frac{3^2 \cdot (8 - 2 \cdot 3)^3}{(5^2 \cdot 3 - 72) \cdot (-4)} + 2 \cdot \{15 - 20 : (4 + 3 \cdot 2)\}$

שברים פשוטים ועשרוניים:

סיכום כללי:

הגדרה כללית:

השבר הוא חלק מתוך השלם. מקובל לסמן שבר באמצעות קו שבר המפריד בין המונה (החלק העליון) למכנה (החלק התחתון) באופן הבא:

$$\frac{\text{מונה}}{\text{מכנה}}$$

ישנם שלושה סוגים אפשריים של שברים:

- שבר פשוט – בו המונה קטן מהמכנה (ולכן תמיד יהיה קטן מ-1).
- שבר מדומה – בו המונה גדול מהמכנה (יהיה גדול בערכו מ-1).
- שבר מעורב – המכיל שילוב של מספר שלם ושבר כלשהו.

שבר עשרוני:

שבר שהמכנה שלו הוא מספר המהווה כפולות של 10 כגון: 10, 100, 1000 ...
שבר עשרוני מיוצג ע"י נקודה עשרונית אשר מבדילה בין החלק שלם לחלק השברי
באופן הבא:

$$\underbrace{XX}.\underbrace{YYY}$$

שברים שלמים

כדי להמיר שבר פשוט לשבר עשרוני המכנה צריך להיות בכפולות של 10.

אחוזים:

הגדרה:


השבר $\frac{1}{100}$ מוגדר להיות אחוז אחד ומסומן באופן הבא: 1%.

באופן זה השבר $\frac{45}{100}$ יכתב: 45%, והשבר $\frac{145}{100}$ יכתב: 145%.


שאלות:

12) צבע את החלקים המתאימים בכל עיגול:


ב. צבע $\frac{1}{6}$ מהעיגול




א. צבע $\frac{1}{2}$ מהעיגול



ד. צבע $\frac{2}{5}$ מהעיגול




ג. צבע $\frac{3}{8}$ מהעיגול




13) כתוב את השבר המתאים לחלקים הצבועים בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. שבר:




ג. שבר:



ב. שבר:



ד. שבר:



14) הרחב את השברים הבאים:

א. השבר: $\frac{1}{2}$ לפי בסיס 4, לפי בסיס 18, לפי בסיס 40.

ב. השבר $\frac{3}{5}$ לפי בסיס 10, לפי בסיס 25, לפי בסיס 60.

ג. השבר $\frac{5}{8}$ לפי בסיס 16, לפי בסיס 32, לפי בסיס 88.

15) צמצם את השברים הבאים ככל הניתן:

א. $\frac{25}{30}$	ב. $\frac{10}{30}$	ג. $\frac{6}{24}$	ד. $\frac{4}{20}$
ה. $\frac{35}{56}$	ו. $\frac{24}{42}$	ז. $\frac{36}{48}$	ח. $\frac{33}{121}$

16) המר את השברים המדומים הבאים לשברים מעורבים:

א. $-\frac{20}{3}$	ב. $\frac{19}{4}$	ג. $\frac{12}{5}$	ד. $\frac{22}{5}$
ה. $-\frac{34}{6}$	ו. $-\frac{50}{7}$	ז. $\frac{47}{8}$	ח. $\frac{60}{9}$

(17) המר את השברים המעורבים הבאים לשברים מדומים :

א. $1\frac{2}{3}$	ב. $3\frac{5}{6}$	ג. $4\frac{1}{2}$	ד. $6\frac{1}{4}$
ה. $11\frac{3}{4}$	ו. $-2\frac{5}{8}$	ז. $-6\frac{2}{7}$	ח. $12\frac{7}{9}$

(18) קבע איזה שבר גדול יותר בכל אחד מהמקרים הבאים :

א. $\frac{4}{10}$ או $\frac{3}{10}$	ב. $\frac{7}{6}$ או $\frac{7}{8}$
ג. $\frac{5}{6}$ או $\frac{2}{3}$	ד. $\frac{7}{12}$ או $\frac{5}{18}$

(19) המר את השברים העשרוניים הבאים לשברים פשוטים מצומצמים או מעורבים :

א. 0.7	ב. 0.07	ג. 0.007	ד. 0.34
ה. 0.304	ו. 0.65	ז. 1.2	ח. 1.02
ט. 1.42	י. 3.5	יא. 6.03	יב. 5.125

(20) המר את השברים הבאים לשברים עשרוניים :

א. $\frac{3}{10}$	ב. $\frac{3}{100}$	ג. $\frac{3}{1000}$	ד. $\frac{23}{1000}$
ה. $\frac{1}{2}$	ו. $\frac{3}{4}$	ז. $\frac{2}{5}$	ח. $\frac{4}{25}$
ט. $\frac{7}{50}$	י. $\frac{3}{20}$	יא. $\frac{7}{8}$	יב. $\frac{9}{16}$
יג. $9\frac{1}{10}$	יד. $3\frac{1}{5}$	טו. $4\frac{7}{8}$	טז. $-4\frac{1}{16}$

(21) כתוב את השברים הבאים בצורתם העשרונית (היעזר במחשבון וכתוב עד 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית) :

א. $\frac{2}{3}$	ב. $\frac{5}{6}$	ג. $\frac{3}{7}$	ד. $\frac{2}{11}$
------------------	------------------	------------------	-------------------

(22) המר מאחוזים לשברים פשוטים :

א. 25%	ב. 32%	ג. 64%	ד. 80%
ה. 120%	ו. 5%	ז. 300%	ח. 150%

(23) המר משברים פשוטים לאחוזים :

א. $\frac{3}{4}$	ב. $\frac{1}{8}$	ג. $\frac{4}{5}$	ד. $\frac{7}{20}$
ה. $\frac{11}{40}$	ו. $\frac{70}{125}$	ז. $\frac{5}{6}$	ח. $\frac{4}{9}$

כפל וחילוק שברים:

סיכום כללי:

- כשכופלים שני שברים יש לכפול מונה במונה ומכנה במכנה.
 - במידה ומדובר במספר שלם הכופל שבר, יש לכפול אותו במונה.
 - במידה ומדובר בשברים מעורבים, יש להפוך אותם תחילה לשברים מדומים ורק אז לבצע את פעולת הכפל.
- כדי לחלק שברים, יש לכפול את השבר הראשון בהופכי של השבר השני.
 - הופכי של שבר מסוים מתקבל ע"י החלפת המונה במכנה.

שאלות:

(24) חשב את ערכי הביטויים הבאים :

א. $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4}$	ב. $\frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6}$	ג. $\frac{2}{9} \cdot \frac{8}{10}$
ד. $3 \cdot \frac{4}{5}$	ה. $6 \cdot \frac{2}{3}$	ו. $\frac{12}{25} \cdot 5$
ז. $1\frac{3}{5} \cdot 2\frac{1}{4}$	ח. $3\frac{1}{2} \cdot 4\frac{2}{5}$	ט. $3\frac{3}{7} \cdot 2\frac{2}{5}$
י. $\left(\frac{4}{5}\right)^3$	יא. $\frac{4}{5^3}$	יב. $\frac{4^3}{5}$

25) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

א. $\frac{2}{5} : \frac{4}{9}$	ב. $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$	ג. $\frac{3}{25} : \frac{7}{10}$
ד. $8 : \frac{2}{9}$	ה. $10 : \frac{2}{3}$	ו. $\frac{5}{6} : 3$
ז. $\frac{2}{5} : 5$	ח. $3\frac{3}{4} : 5\frac{5}{8}$	ט. $2\frac{2}{5} : 1\frac{3}{15}$

חיבור חיסור שברים:

סיכום כללי:

כפולה משותפת מינימלית:

בהינתן זוג מספרים a ו- b , המספר הקטן ביותר אשר תוצאת חלוקתו במספרים הנ"ל מניבה מספר שלם נקרא הכפולה המינימלית שלהם.

הערות:

- כפולה מינימלית יכולה להיות גם עבור יותר משני מספרים.
- הכפולה המינימלית תהיה המכנה המשותף בעת פעולות חיבור וחסור של שברים.

כללי החיבור והחסור של שברים:

- חיבור וחסור של שברים בעלי אותו המכנה מתבצע על המספרים שבמונה בלבד כאשר המכנה נשאר כפי שהוא.

$$\text{דוגמא: } \frac{2}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2-3}{7} = \frac{-1}{7}, \quad \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$$

- חיבור וחסור של שברים בעלי מכנים שונים מתבצע ע"י פעולת מכנה משותף.

$$\text{דוגמא: } \frac{1}{4} - \frac{5}{6} = \frac{3}{12} - \frac{10}{12} = \frac{3-10}{12} = -\frac{7}{12}, \quad \frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{6+5}{15} = \frac{11}{15}$$

- חיבור של שבר עם מספר שלם יתבצע באופן ישיר.

$$\text{דוגמא: } 3 + \frac{1}{4} = 3\frac{1}{4}$$

חיסור של שבר ממספר שלם יתבצע ע"י הוצאת שלמים מהשבר.

$$\text{דוגמא: } 3 - \frac{1}{4} = 2\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}$$

דרך נוספת היא ע"י העברת המספר השלם לשבר מדומה: $3 - \frac{1}{4} = \frac{12}{4} - \frac{1}{4} = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

- חיבור וחיסור של שברים מעורבים יתבצע ע"י העברתם לשברים מדומים תחילה.

$$\text{דוגמא: } 3\frac{2}{5} + 2\frac{1}{6} = \frac{17}{5} + \frac{13}{6} = \frac{17 \cdot 6}{30} + \frac{13 \cdot 5}{30} = \frac{102 + 65}{30} = \frac{167}{30} = 5\frac{17}{30}$$

ניתן גם לפצל ולבצע את פעולת החיבור (או החיסור) של המספרים השלמים תחילה, ולאחר מכן לבצע את הפעולה עבור השברים.

$$\text{דוגמא: } 2\frac{3}{4} - 5\frac{1}{3} = (2 - 5) + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right) = -3 + \left(\frac{9}{12} - \frac{4}{12}\right) = -3 + \frac{5}{12} = -2\frac{7}{12}$$

שאלות:

(26) מצא את הכפולה המשותפת המינימלית של המספרים הבאים:

- | | | | |
|-----------|----------|--------------|-------------|
| א. 2 ו-3 | ב. 2 ו-4 | ג. 3 ו-5 | ד. 6 ו-10 |
| ה. 4 ו-10 | ו. 4 ו-6 | ז. 3, 5 ו-10 | ח. 2, 3 ו-8 |

(27) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

- | | |
|--|---|
| א. $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$ | ב. $\frac{5}{9} + \frac{2}{9}$ |
| ג. $\frac{4}{13} + \frac{9}{13}$ | ד. $\frac{7}{8} + \frac{7}{8}$ |
| ה. $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$ | ו. $\frac{8}{9} - \frac{7}{9}$ |
| ז. $\frac{2}{12} - \frac{5}{12}$ | ח. $\frac{2}{5} - \frac{6}{5}$ |
| ט. $\frac{2}{8} + \frac{5}{8} + \frac{6}{8}$ | י. $\frac{7}{15} + \frac{8}{15} - \frac{6}{15}$ |

28) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

ב. $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

א. $\frac{1}{2} + \frac{4}{3}$

ד. $\frac{3}{6} - \frac{5}{8}$

ג. $\frac{4}{6} - \frac{1}{12}$

ו. $\frac{7}{3} + \frac{6}{5} + \frac{3}{10}$

ה. $\frac{5}{4} + \frac{7}{2} + \frac{2}{8}$

ח. $\frac{1}{4} + \frac{2}{8} - \frac{3}{5}$

ז. $\frac{4}{7} - \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$

29) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

ב. $2 - \frac{5}{6}$

א. $2 + \frac{5}{6}$

ד. $2\frac{1}{4} - \frac{5}{6}$

ג. $2\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$

ו. $5\frac{7}{8} - 6\frac{1}{2}$

ה. $3\frac{2}{3} + 4\frac{1}{4}$

ח. $\frac{3}{4} - 1\frac{1}{5} + \frac{8}{20}$

ז. $2 + \frac{5}{6} - \frac{1}{9}$

30) חשב את ערכי הביטויים הבאים:

א. $\frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\right) + 2\frac{1}{3}$

ב. $\frac{3}{14} : \frac{2}{7} + \frac{1}{3} \cdot 2\frac{1}{4} - \frac{2}{5}$

ג. $\frac{5}{11} \cdot 2\frac{3}{4} - 6 : \frac{2}{5}$

ד. $2\frac{4}{5} : \frac{9}{10} \cdot \frac{6}{7} + \frac{1}{6}$

ה. $\frac{5}{6} : \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \cdot 3\frac{1}{4}$

בעיות יסודיות באחוזים:

סיכום כללי:

נוסחה לביצוע חישובים עם אחוזים:

$$\text{תמורת האחוז} = \text{שלם} \cdot \frac{\text{אחוז}}{100}$$

למשל, בהינתן גודל שלם 120, אשר יש לחשב כמה הם 40 אחוזים ממנו, נקבל לפי הנוסחה: $48 = \frac{40}{100} \cdot 120$, כלומר: **תמורת האחוז 40 מהגודל 120 היא 48.**

שאלות:

31 בכיתה 30 תלמידים. 60% מתוכם בנות.

א. כמה בנות בכיתה?

ב. כמה בנים בכיתה?

32 בכיתה 28 בנות המהוות 70% מכלל התלמידים בכיתה.

א. כמה תלמידים בכיתה?

ב. כמה בנים בכיתה?

33 מחיר בגד-ים הוא 300 ₪. בסוף העונה הוא נמכר ב-20% הנחה.

א. מהו מחירו בסוף העונה?

ב. מה גודל ההנחה?

34 מחיר ההשקה של בושם מסוים הוא 500 ₪. לאחר מכן מועלה מחירו ב-8%.

א. מה מחירו הסופי?

ב. מה גודל ההתייקרות?

35 מחיר ליטר דלק הוא 5 ₪ לליטר. בחנוכה מוזל מחירו ב-7%.

בפסח מועלה מחירו ב-7%. מה מחירו בסוף השנה?

36 מוצר מסויים מתייקר בסוכות ב-12%. בפורים מוזל המוצר ב-12%.

מחירו בסוף השנה הוא 394.24 ₪. מה מחירו בתחילת השנה?

37) ענה על השאלות הבאות:

- א. באולם קולנוע 200 צופים, מתוכם 176 בנים. מה אחוז הבנים בקהל?
- ב. בכיתה 30 תלמידים, מתוכם 18 בנות. מה אחוז הבנות בכיתה?
- ג. מחיר מוצר התייקר מ-80 ש"ח ל-120 ש"ח. בכמה אחוזים התייקר המוצר?
- ד. מחיר מוצר הוזל מ-120 ש"ח ל-80 ש"ח. בכמה אחוזים הוזל המוצר?
- ה. מחיר מוצר התייקר מ-150 ש"ח ל-200 ש"ח. בכמה אחוזים התייקר המוצר?
- ו. מחיר מוצר מוזל הוזל מ-200 ש"ח ל-150 ש"ח. בכמה אחוזים הוזל המוצר?

חזרה על תבניות מספר:

סיכום כללי:

משתנה הוא סמל המתאר כמות או גודל כלשהם אשר אינם ידועים ועשויים להשתנות. תבנית מספר היא ביטוי אלגברי אשר מכיל משתנה (או משתנים). ניתן להציב במשתנים ערכים מספריים שונים ולקבל תוצאות שונות עבור תבנית המספר עצמה.

במתמטיקה, תפקידה של תבנית המספר הוא להביע גודל מסוים אשר לערכו יש משמעויות שונות. דוגמא לכך היא: קנייה של x פריטים, אשר כל אחד עולה 3 שקלים, יניבו תבנית מספר של $3 \cdot x$ אשר מייצגת את הסכום הכולל של הפריטים.

שאלות:

38) חשב את ערכי הביטויים האלגבריים הבאים עבור ה- x הנתון:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| א. $2x+5$ כאשר $x=3$ | ב. x^2+3x כאשר $x=2$ |
| ג. $-x^2+2x+3$ כאשר $x=5$ | ד. $-x^2-9x+5$ כאשר $x=5$ |
| ה. x^3+1 כאשר $x=-2$ | ו. $4-x^3$ כאשר $x=-1$ |
| ז. $(x+1)(2-x)$ כאשר $x=4$ | ח. $x^2(3x-4)$ כאשר $x=3$ |

39) חשב את ערכי הביטויים האלגבריים הבאים עבור ה- x הנתון:

- | | |
|--|--|
| א. $27x^5 - 2x^3 + x$ כאשר $x = \frac{1}{3}$ | ב. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + 6$ כאשר $x = -\frac{2}{3}$ |
|--|--|

40 הצב את הערכים המספריים במקום הפרמטרים וחשב את ערך תבנית המספר :

- | | |
|----------------------------------|---|
| א. $a^2 + 2ab + b^2$ | עבור : $a = 3, b = -5$ |
| ב. $(x-3)^2 + 3x^2b$ | עבור : $x = 5, b = -1$ |
| ג. $-x^3 - 2xy + y^4$ | עבור : $x = -2, y = -1$ |
| ד. $\frac{(a-2c)^4}{a} - a^2$ | עבור : $a = 2, c = -2$ |
| ה. $\frac{4a^2 - 3b}{c}$ | עבור : $a = -1, b = 2, c = -4$ |
| ו. $\sqrt{c-3a}$ | עבור : $c = 13, a = -1$ ועבור : $c = 82, a = \frac{1}{3}$ |
| ז. $\frac{p^3 + 2\sqrt{q+1}}{m}$ | עבור : $p = -5, q = 48, m = 3$ |

כינוס איברים:

סיכום כללי:

תבניות אלגבריות יכולות להכיל איברים רבים ולכן נרצה לכנס אותם על מנת לפשט את התבנית. כדי לכנס איברים ניקח את כל קבוצת האיברים מאותו הסוג ונחבר את המקדמים שלהם. דוגמא : $3x + 6x - 5x = (3 + 6 - 5)x = 4x$.
 איברים שונים נבדלים זה מזה בערך התבנית האלגברית שלהם.
 כך : $3x$ שונה מ- $4y$ ושונה מ- $2xy$. באותו האופן, האיברים x ו- x^2 הם שונים.

שאלות:

41) כנס איברים דומים:

- | | |
|--|---|
| א. $5x + 7x - 4x$ | ב. $9x^2 - 2x^2 - 3x^2 - 2x^2$ |
| ג. $-10xy + 15xy + xy - 2yx$ | ד. $x^2y - 3yx^2 + x^2y$ |
| ה. $8a^2 + 10a - 5a^2 - 11a + a^2$ | ו. $2x^2 - 3m^2 - x^2 + 3m^2$ |
| ז. $3xy + y - 30y + 6yx - 7y$ | ח. $mn^2 + 4m^2n + 6n^2m - 10nm^2 + mn^2$ |
| ט. $-6 + x^3 + 4 - 3x^3 + 17x^3 - 17$ | י. $y^2 + x^2 - 5x^2 + 5y^2 + 4x^2 - 6y^2$ |
| יא. $7x^2 - 3x - 4x + 2$ | יב. $5xy + 2x - 3yx - x + 1$ |
| יג. $3 - x - x^2 + 4x + 5x^2 - 12$ | יד. $x + xy + y - 6yx - 6y - 6x$ |
| טו. $mn + n - 5m + 5nm - 14n + 3m$ | יז. $ab^2 + 6ba^2 - 6b + 16a^2b + 3b - 6b^2a$ |
| יז. $z^3 - 4z^2 + 7 - z^3 - 8 + 8z^2$ | יח. $4x^2z + 6xz^2 - 6 - xz^2 + 12 + 10zx^2$ |
| יט. $2 - x^3 - 3 - 4x^2 + 2x + x^3 + x^2 - 2$ | כ. $x^3 - 3x - 4x^2 + 2x + x^3 + x^2 - 2x^3$ |
| כא. $2a^2b + 3x^2y + 5a^2b + 10x^2y$ | כב. $12x^2y^3 + 13a^2 - 20x^2y^3 + 2a^2$ |
| כג. $2y^2 - 4x^3y^2 - 10y^2 - x^3y^2$ | כד. $-2x^3y + 5x^2 - 4yx^3 - 6x^2$ |
| כה. $2a^2b + 2b + 3a^2 + 5b$ | כו. $5a^2b - 8ab^2 + 20a^2b - 14ab^2$ |
| כז. $-12x^2 + 2y^2 + 3x^2y + 14xy^2 - 5xy^2 - 6y^2 + 2xy + 11x^2 + x^2y - 9xy$ | |
| כח. $21x^3y^3 + x^2y^2 - 3xy^3 + x^3y - 15x^2y^2 - 7x^3y + 12x^3y^3 - 4xy^3 + 4xy^3 - 6x^3y$ | |

פישוט ביטויים ע"י פתיחת סוגריים:

סיכום כללי:

בעת ביצוע כפל בין שני איברים יש לכפול את המקדמים בנפרד ואת האותיות (משתנים) בנפרד.

כלל הפילוג:

$$\bullet a(b+c) = ab+ac$$

$$\bullet (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

שאלות:

42 פשט את הביטויים הבאים:

ג. $-2x \cdot (-4x) \cdot (-3)$

ב. $-4x \cdot (-7x)$

א. $2x \cdot 3x$

ו. $-b \cdot 4b^2 \cdot \frac{b^2}{2}$

ה. $3a^3 \cdot (-2a^2)$

ד. $8m^2 \cdot 4m^3$

ט. $ab \cdot (-2a^2b)$

ח. $4a^2 \cdot 7b^2$

ז. $a \cdot 3b$

43 פשט את הביטויים הבאים ע"י פתיחת סוגריים:

ב. $2(-3x^2+5x-1)$

א. $2(3x-4)$

ד. $(1-2x)(-2)$

ג. $(7x-2)4$

ו. $b(b^2-3b+4)$

ה. $a(3a-1)$

ח. $5x(x^2+2x-3)$

ז. $2x(5x+3)$

י. $\frac{5}{2}(4d^4-3d)d$

ט. $3t^2(4t-t^2+6)$

44 פשט את הביטויים הבאים :

ב. $7x + (-4x - 5) + 3x + (-1 + 7x)$

א. $5x + (3x - 2) + (-4 - 2x)$

ד. $-6x - (-3x - 1) - (-7 - 4x) + 1$

ג. $8 - (2x - 5) - (4x + 2)$

ה. $(3 - 2x^2 + 4)2 + 3(x - x^2) - 6(7 - 5x) + 4x^2$

ו. $3y^2 - (y + 1 - 2y^2) + 6(5y - 6) - (-y - 4)3 + 5(y^2 + 1) - 7$

45 פשט את הביטויים הבאים :

ב. $(x + 3)(x - 7)$

א. $(x - 1)(x + 2)$

ד. $(3x + 4)(5x + 1)$

ג. $(3 - x)(x + 4)$

ו. $-2(3x - 1)(5 - 2x)$

ה. $3(4x + 1)(2x - 3)$

46 פשט את ערכי הביטויים הבאים :

א. $(x - 1)(x + 3) + 2(3 - x)$

ב. $(a + 4)(a - 2) - (a + 5)(a - 3)$

ג. $(2m - 3)(4m + 3) + 5(2m^2 - 6)$

ד. $-x^2y^2(x^3y + x^2) + 2xy(2x^3y - x^4y^2)$

פישוט ביטויים באמצעות נוסחאות הכפל המקוצר:

סיכום כללי:

• נוסחת ריבוע של סכום/הפרש: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.

• נוסחה להפרש ריבועים: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

שאלות:

(47) פשט את הביטויים הבאים:

$(4x+5)^2$.ג	$(x+2)^2$.ב	$(x+5)^2$.א
$(5x+2y)^2$.ו	$(7x+y)^2$.ה	$(6x+2)^2$.ד
$(x^3+2y^2x)^2$.ט	$(x^2+y^2)^2$.ח	$(x^2+7)^2$.ז

(48) פשט את הביטויים הבאים:

$(5-x)^2$.ג	$(x-2)^2$.ב	$(x-6)^2$.א
$\left(\frac{1}{3}x-5\right)^2$.ו	$\left(3x-\frac{1}{2}\right)^2$.ה	$(6x-1)^2$.ד
$(x^2y^2-7)^2$.ט	$\left(x^2-\frac{3}{5}y\right)^2$.ח	$(3m-2n)^2$.ז

(49) פשט את הביטויים הבאים:

$(3+x)(x-3)$.ב	$(x-5)(x+5)$.א
$(5-7x)(7x+5)$.ד	$(3x-1)(3x+1)$.ג
$\left(5y-\frac{1}{4}x\right)\left(\frac{1}{4}x+5y\right)$.ו	$\left(\frac{1}{2}x+6\right)\left(\frac{1}{2}x-6\right)$.ה
$(3a^2b^3-4)(3a^2b^3+4)$.ח	$(x^2+y)(x^2-y)$.ז

(50) פשט את הביטויים הבאים:

$(x-5)(5x-1)+2(4+x)$.ב	$(x+1)(x+2)-3x$.א
$-(y+3x)(y-3x)+(y-3x)^2$.ד	$x(2x-1)(2x+1)-4x^2(x+1)$.ג
	$x(x+3)-(6+x)(6x+2)-(x+2)^2$.ה
	$-5(x+7)(x-7)+3(2x+5)(5-x)+(x+1)^2$.ו

פירוק לגורמים של ביטויים אלגבריים:

סיכום כללי:

פירוק לגורמים הוא פעולה הפוכה לפתיחת סוגריים – נרצה להוציא את הגורמים המשותפים לאיברים מחוץ לסוגריים.

- פירוק לגורמים ע"י הוצאת איבר אחד משותף:

○ הוצאת מספר משותף: $2x - 8 = 2(x - 4)$

○ הוצאת אות משותפת: $x^2 - 12x = x(x - 12)$

○ הוצאת מספר ואות יחד: $3x^2 - 21x = 3x(x - 7)$

- פירוק לגורמים ע"י נוסחאות הכפל המקוצר:

○ נוסחת הבינום של ניוטון: $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

○ נוסחה להפרש ריבועים: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

שאלות:

51) פשט את הביטויים הבאים ע"י הוצאת גורם משותף:

א. $3x - 12$ ב. $6y - 4$

ג. $20 - 8a$ ד. $4a^3 + 8b$

ה. $75m^2 + 25m + 15$ ו. $40a^2 - 8b^2 + 64c^2$

52) פשט את הביטויים הבאים ע"י הוצאת גורם משותף:

א. $y^2 + 5y$ ב. $3x - 11x^3$

ג. $6y^2 + 5y^3 + 4y$ ד. $\frac{1}{2}a^7 - \frac{1}{4}a^5 + a^3$

53) פשט את הביטויים הבאים ע"י הוצאת גורם משותף :

א. $2x^2 - 8x$	ב. $3t^2 + 12t$
ג. $5n^3 - 20n^2 + 50n$	ד. $8y^2 + 6y^3 - 2y^4$
ה. $4x^2y^2 + 16x^2y - 20xy^2$	ו. $27mn - 3n^2m + 9n^3m$

54) פשט את הביטויים הבאים ע"י שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר :

א. $x^2 + 10x + 25$	ב. $x^2 + 12x + 36$
ג. $y^2 - 18y + 81$	ד. $y^2 - 22y + 121$
ה. $4x^2 + 4x + 1$	ו. $16y^2 - 8y + 1$
ז. $9x^2 - 24x + 16$	ח. $25x^2 + 70x + 49$

55) פשט את הביטויים הבאים ע"י שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר :

א. $r^2 - 25$	ב. $x^2 - 81$
ג. $25y^2 - 49$	ד. $121x^2 - 1$
ה. $x^2y^2 - 4$	ו. $9y^4 - 169x^4$

56) פשט את הביטויים הבאים ע"י הוצאת גורם משותף ונוסחאות הכפל המקוצר :

א. $y - y^3$	ב. $x^3 - 10x^2 + 25x$
ג. $m^4 - 1$	ד. $196x^4 - 140x^3 + 25x^2$

פירוק הטרינום:

סיכום כללי:

טרינום משמעו תלת איבר מהצורה: $ax^2 + bx + c$ כאשר a, b ו- c הם מספרים כלשהם.

שיטת הטרינום מאפשרת לפרק את תלת האיבר ל-4 איברים ע"י פיצול האיבר bx לשני איברים באופן כזה שמאפשר להוציא גורם משותף.

הכלל הוא למצוא שני מספרים, m_1 ו- m_2 , שמקיימים: $m_1 + m_2 = b$ ו- $m_1 \cdot m_2 = ac$.
לאחר מכן ניתן לפרק את הטרינום: $ax^2 + bx + c = ax^2 + m_1x + m_2x + c$.
השלב האחרון הוא הוצאת גורם משותף מכל זוג: $ax^2 + \underbrace{m_1x + m_2x} + c$.

הערה:

במקרה שנוסחת השורשים ידועה, ניתן להיעזר בה כדי למצוא את המספרים m_1 ו- m_2 באופן

הבא: $m_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $m_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ולאחר מכן ניתן לכתוב את הטרינום

כמכפלה: $ax^2 + bx + c = a(x - m_1)(x - m_2)$. אם קיים פתרון (שורש) אחד $m_1 = m_2 = \frac{-b}{2a}$ אז

נכתוב: $ax^2 + bx + c = a(x - m_1)^2$ ואם לא קיימים פתרונות אז לא קיים פירוק כלל.

שאלות:

57) פרק את הביטויים הבאים לפי פירוק טרינום:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| א. $x^2 + 5x + 4$ | ב. $x^2 - 8x + 15$ | ג. $x^2 - 33x + 62$ |
| ד. $2x^2 + 7x - 15$ | ה. $3x^2 - 11x + 6$ | ו. $6x^2 + 5x + 1$ |
| ז. $2x^2 + x - 6$ | ח. $x^2 - 18x + 81$ | ט. $x^2 + 2x + 8$ |

58) פרק את הביטויים הבאים ע"י שימוש בנוסחת השורשים.
הערה: במידה ולא למדת על נוסחת השורשים התעלם משאלה זו.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| א. $6x^2 + 5x + 1$ | ב. $x^2 + 5x + 4$ |
| ג. $4x^2 + 20x + 25$ | ד. $3x^2 - x + 20$ |

שברים אלגבריים:

סיכום כללי:

הגדרה:

שבר אלגברי מורכב משתי תבניות, אשר אחת מחלקת את השנייה.

$$\text{דוגמא לשברים אלגבריים: } \frac{x+1}{x+2}, \frac{3x}{x^2+1}, \frac{4}{x-x^3}$$

במקרה בו המכנה הוא מספר, לא מדובר בשבר אלגברי מכיוון שניתן לכתוב את

$$\text{הביטוי ללא צורך בחילוק בין ביטויים שונים כגון: } \frac{3x+5}{4} = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

תחום הגדרה של שבר:

היות ושבר אלגברי הוא תבנית אשר יכולה לקבל ערכים שונים בעת הצבות שונות, חשוב להגביל את המספרים שניתן להציב באופן כזה שלא תתקבל חלוקה באפס.

$$\text{דוגמא: השבר } \frac{1}{x+4} \text{ לא מוגדר כאשר } x = -4 \text{ מכיוון שמתקבל: } \frac{1}{0}$$

במקרים אלו נדרוש **תנאי** על המשתנה אשר יכתב באופן הבא: $x \neq -4$ ומשמעו היא ש- x יכול לקבל על ערך מספרי אפשרי למעט -4, מכיוון שבמקרה זה השבר לא מוגדר.

כלל צמצום שברים אלגבריים:

ניתן לצמצם שברים אלגבריים ע"י הבאת המונה והמכנה למכפלה של ביטויים. במידה וקיימות פעולות החיבור והחיסור בין איברים שונים לא ניתן לבצע צמצום של איברים דומים בין המונה והמכנה. להלן מספר דוגמאות הנוגעות לצמצומים:

$$\bullet \text{ צמצום ע"י הוצאת גורם משותף: } \frac{2x+8}{x+4} = \frac{2(x+4)}{x+4} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2$$

$$\bullet \text{ צמצום ע"י נוסחת כפל מקוצר: } \frac{3x-15}{x^2-10x+25} = \frac{3(x-5)}{(x-5)^2} = \frac{3 \cdot 1}{x-5} = \frac{3}{x-5}$$

$$\bullet \text{ צמצום ע"י פירוק טרינום: } \frac{x^2-2x-3}{x^2-3x-4} = \frac{(x+1)(x-3)}{(x+1)(x-4)} = \frac{x-3}{x-4}$$

שאלות:

59 מצא את תחום ההגדרה של השברים האלגבריים הבאים :

א. $\frac{x+4}{x+3}$	ב. $\frac{5}{x-6}$
ג. $\frac{x+7}{2x-8}$	ד. $\frac{x^2+1}{x^2-4x}$
ה. $\frac{3}{x^2+2x+1}$	ו. $\frac{x^2}{x^2-4}$
ז. $\frac{6}{y^4-y^2}$	ח. $\frac{8x-2}{3x^3-15x^2+12x}$

60 צמצם את השברים הבאים (במידה ולא ניתן צמצם הסבר מדוע) :

א. $\frac{ax}{a}$	ב. $\frac{a-x}{a}$
ג. $\frac{a-ax}{a}$	ד. $\frac{x+1}{y+1}$
ה. $\frac{x}{x+y}$	ו. $\frac{6x}{6y}$
ז. $\frac{x^2y}{xy^2}$	ח. $\frac{x^2+y^2}{x^2y^2}$
ט. $\frac{4x^2y}{xy}$	י. $\frac{3x^2}{x^2+3}$

61 צמצם את השברים הבאים ע"י הוצאת גורם משותף וכתוב את תחום הגדרתם :

א. $\frac{3x+12}{x+4}$	ב. $\frac{m^2+4m}{4m+16}$
ג. $\frac{2a-12}{a^2-6a}$	ד. $\frac{x^2-5x}{15-3x}$
ה. $\frac{3-18y^2}{6y^2-1}$	ו. $\frac{4x^3-2x^2}{6x-3}$
ז. $\frac{3y}{y^3-3y^2}$	ח. $\frac{3z^3-12z^2+4z}{z^2+5z}$

62) צמצם את השברים הבאים ע"י פירוק לגורמים וכתוב את תחום הגדרתם:

א. $\frac{x^2 + 10x + 25}{2x + 10}$	ב. $\frac{8n - n^2}{n^2 - 16n + 64}$
ג. $\frac{z^3 - 4z^2}{2z^2 - 16z + 32}$	ד. $\frac{4m^2 + 20m + 25}{4m^2 + 10m}$
ה. $\frac{18y^2 - 24y + 8}{2y - 3y^2}$	ו. $\frac{a^3 + 4a^2b + 4ab^2}{3ab + 6b^2}$

63) צמצם את השברים הבאים ע"י טרינום ריבועי וכתוב את תחום הגדרתם:

א. $\frac{x + 2}{x^2 - 3x - 10}$	ב. $\frac{m^2 - 12m + 32}{m - 4}$
ג. $\frac{4y - 10}{2y^2 + y - 15}$	ד. $\frac{3z^2 + 26z + 16}{3z + 2}$
ה. $\frac{x^2 + 5x - 36}{x^3 + 9x^2}$	ו. $\frac{9n^2 - 12n}{4 + 5n - 6n^2}$
ז. $\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 5x + 6}$	ח. $\frac{x^2 - 14x + 49}{x^2 + x - 56}$
ט. $\frac{3a^2b - 10ab^2 + 3b^3}{-3a^3b + 11a^2b^2 - 6ab^3}$	י. $\frac{m^3n - m^2n^2 - m^2 + mn}{2m^2n^3 + mn^2 - 3n}$

כפל וחילוק של שברים אלגבריים:

סיכום כללי:

כפל שברים יתבצע ע"י הכפלת כל מונה בנפרד והכפלת כל מכנה בנפרד.
חילוק שברים יתבצע ע"י לקיחת ההופכי של שבר המחלק וביצוע פעולת כפל.

- דוגמא לכפל שברים: $\frac{x+1}{x^2} \cdot \frac{x}{3x+3} = \frac{x+1}{x^2} \cdot \frac{x}{3(x+1)} = \frac{\cancel{x}(x+1)}{3x^{\cancel{2}}(x+1)} = \frac{1}{3x}$
- דוגמא לחילוק שברים: $\frac{4x}{y} : \frac{12}{y^2+y} = \frac{4x}{y} \cdot \frac{y^2+y}{12} = \frac{\cancel{4}x}{\cancel{12}} \cdot \frac{\cancel{y}(y+1)}{\cancel{12}} = \frac{x(y+1)}{3}$

שאלות:

64 פשט את הביטויים הבאים:

א. $\frac{x}{3} \cdot \frac{x}{8}$	ב. $\frac{x}{3} \cdot \frac{9}{x^2}$
ג. $7y \cdot \frac{5}{y^2}$	ד. $6x^2 \cdot \frac{3}{40x}$
ה. $(x^2 + 3x) \cdot \frac{2}{3x + 9}$	ו. $(a^2 - 25) \cdot \frac{20}{5a + 25}$
ז. $\frac{w^2 - 9}{w} \cdot \frac{w^2}{2w + 6}$	ח. $\frac{y + 4}{y^2 + 16} \cdot \frac{y^2 - 16}{2y + 8}$
ט. $\frac{z^2 + 30z + 225}{6z + 90} \cdot \frac{12}{2z - 10}$	י. $\frac{5n^2}{n^2 - 121} \cdot \frac{2n^2 + 44n + 242}{n + 2} \cdot \frac{n^2 + 4n + 4}{n}$

65 פשט את הביטויים הבאים:

א. $\frac{x}{8} : \frac{x}{6}$	ב. $\frac{y}{25} : \frac{5}{y}$
ג. $a^2 : \frac{1}{6a}$	ד. $\frac{5}{6a} : a^2$
ה. $(d^2 - 3d) : \frac{5d - 15}{5d}$	ו. $\frac{t}{t + 4} : \frac{3t}{t + 4}$
ז. $\frac{y^2 + 8y + 16}{8y^2} : \frac{y^2 - 16}{7y^2}$	ח. $\frac{a^2 - 64}{a^2 - 36} : \frac{a + 8}{a + 6}$

חיבור וחיסור של שברים אלגבריים:

סיכום כללי:

ביצוע פעולת החיבור והחיסור תתבצע באופן זהה לשברים מספריים. נרצה להרחיב את השברים כך שהמכנה של שניהם יהיה זהה, ולאחר מכן נחבר את המונים. כדי להרחיב את השברים נעזר בפעולת מציאת מכנה משותף. לשם כך נעזר בפירוקים השונים כדי להביא את הביטויים שבכל מכנה לצורתם המופשטת.

דוגמא לחיבור שברים בעלי אותו מכנה :

$$\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x} = \frac{1+(x+1)}{x} = \frac{x+2}{x}$$

דוגמא לחיבור מספר לשבר אלגברי :

$$2 + \frac{3}{x+2} = \frac{2(x+2)}{x+2} + \frac{3}{x+2} = \frac{2(x+2)+3}{x+2} = \frac{2x+7}{x+2}$$

דוגמא לחיבור שברים עם מכנים שונים (ע"י פעולת מכנה משותף) :

$$\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} = \frac{x}{x(x+1)} + \frac{x+1}{x(x+1)} = \frac{x+x+1}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)}$$

דוגמא לחיבור שברים ע"י שימוש בפירוק לגורמים (כדי למצוא מכנה משותף מינימלי) :

$$\frac{1}{x^2-3x} + \frac{3}{x-3} = \frac{1}{x^2-3x} + \frac{3x}{x^2-3x} = \frac{1+3x}{x^2-3x}$$

דוגמא לחיבור שברים ע"י נוסחאות הכפל המקוצר (כדי למצוא מכנה משותף מינימלי) :

$$\frac{3}{x^2-6x+9} - \frac{2}{x^2-9} = \frac{3}{(x-3)^2} - \frac{2}{(x-3)(x+3)} = \frac{3(x+3)-2(x-3)}{(x-3)^2(x+3)} = \frac{x+15}{(x-3)^2(x+3)}$$

שאלות:

66 פשט את הביטויים הבאים :

ב. $\frac{5}{x} + \frac{4x+3}{x}$

א. $\frac{a}{6} + \frac{a-5}{6}$

ד. $\frac{7z}{2z-3} - \frac{4z}{2z-3} - \frac{z+3}{2z-3}$

ג. $\frac{x-2}{x+1} + \frac{3+4x}{x+1}$

67) פשט את הביטויים הבאים:

<p>א. $\frac{1}{ab} - \frac{5}{bc}$</p> <p>ב. $\frac{1}{xy} + \frac{5}{yz} + \frac{4}{xz}$</p> <p>ג. $\frac{c}{ab} - \frac{ad}{bc} + \frac{2b}{cd}$</p> <p>ד. $-\frac{5}{x} + \frac{x+1}{xy^2}$</p> <p>ה. $\frac{1}{(y+1)^2} + \frac{3}{y+1}$</p> <p>ו. $\frac{3}{z(z-3)} - \frac{2}{z(z-2)}$</p>	<p>א. $1 - \frac{2}{x}$</p> <p>ב. $1 + \frac{3}{y^2}$</p> <p>ג. $2 + \frac{2}{x+1}$</p> <p>ד. $3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x}$</p> <p>ה. $\frac{a+1}{a^2} - \frac{3-a}{4a} - 3$</p> <p>ו. $\frac{x}{9yz} + \frac{z}{3y^2x} + \frac{3-y}{12xz} - 3\frac{1}{2}$</p>
---	---

68) פשט את הביטויים הבאים:

<p>א. $\frac{3}{x+1} + \frac{1}{x}$</p> <p>ב. $\frac{4}{y+2} - \frac{3}{y}$</p> <p>ג. $\frac{a+1}{a+2} + \frac{3}{a}$</p> <p>ד. $\frac{1}{z+3} + \frac{2}{3z} - \frac{3}{z}$</p>	<p>א. $\frac{24}{a^2-9} + \frac{4}{a+3}$</p> <p>ב. $\frac{3}{x^2-16} + \frac{2}{(x+4)^2}$</p> <p>ג. $\frac{y}{(y-2)^2} + \frac{3y}{4-y^2}$</p> <p>ד. $\frac{3z}{z^2+4z+3} - \frac{z+0.5}{z^2+2z+1}$</p> <p>ה. $\frac{x-1}{x^2+3x-40} + \frac{2}{-x^2+8x-15}$</p> <p>ו. $\frac{1}{a-b} + \frac{2}{a+2b} - \frac{3b}{a^2+ab-2b^2}$</p>
--	--

69) פשט את הביטויים הבאים:

<p>א. $\frac{24}{a^2-9} + \frac{4}{a+3}$</p> <p>ב. $\frac{3}{x^2-16} + \frac{2}{(x+4)^2}$</p> <p>ג. $\frac{y}{(y-2)^2} + \frac{3y}{4-y^2}$</p> <p>ד. $\frac{3z}{z^2+4z+3} - \frac{z+0.5}{z^2+2z+1}$</p> <p>ה. $\frac{x-1}{x^2+3x-40} + \frac{2}{-x^2+8x-15}$</p> <p>ו. $\frac{1}{a-b} + \frac{2}{a+2b} - \frac{3b}{a^2+ab-2b^2}$</p>	<p>א. $1 - \frac{2}{x}$</p> <p>ב. $1 + \frac{3}{y^2}$</p> <p>ג. $2 + \frac{2}{x+1}$</p> <p>ד. $3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x}$</p> <p>ה. $\frac{a+1}{a^2} - \frac{3-a}{4a} - 3$</p> <p>ו. $\frac{x}{9yz} + \frac{z}{3y^2x} + \frac{3-y}{12xz} - 3\frac{1}{2}$</p>
--	---

70) פשט את הביטויים הבאים:

<p>א. $\frac{24}{a^2-9} + \frac{4}{a+3}$</p> <p>ב. $\frac{3}{x^2-16} + \frac{2}{(x+4)^2}$</p> <p>ג. $\frac{y}{(y-2)^2} + \frac{3y}{4-y^2}$</p> <p>ד. $\frac{3z}{z^2+4z+3} - \frac{z+0.5}{z^2+2z+1}$</p> <p>ה. $\frac{x-1}{x^2+3x-40} + \frac{2}{-x^2+8x-15}$</p> <p>ו. $\frac{1}{a-b} + \frac{2}{a+2b} - \frac{3b}{a^2+ab-2b^2}$</p>	<p>א. $1 - \frac{2}{x}$</p> <p>ב. $1 + \frac{3}{y^2}$</p> <p>ג. $2 + \frac{2}{x+1}$</p> <p>ד. $3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x}$</p> <p>ה. $\frac{a+1}{a^2} - \frac{3-a}{4a} - 3$</p> <p>ו. $\frac{x}{9yz} + \frac{z}{3y^2x} + \frac{3-y}{12xz} - 3\frac{1}{2}$</p>
--	---

71 פשט את הביטויים הבאים :

<p>א. $\frac{4}{x} \cdot \frac{x^2}{8} + \frac{9}{x+1} \cdot \frac{x+1}{18}$</p> <p>ב. $\left(\frac{2}{x} + 1\right) \cdot \frac{x^2}{7x+14}$</p>	<p>ג. $\frac{7}{y^2} : \frac{6}{y^3} - \frac{y-4}{63} \cdot \frac{3y-4}{y^2-8y+16}$</p> <p>ד. $\left(3x - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x}\right) : \frac{6x^3+2x-4}{x^2}$</p>
<p>ה. $\left(\frac{2x+1}{20x^2-28x-3} - \frac{3x+1}{30x^2-17x-2}\right) : \frac{18x+3}{6x^2-13x+6}$</p>	

שברים כפולים:

סיכום כללי:

$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$: כאשר מתקיים $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

נובע מכאן כי ניתן לצמצם ביטויים בין שני המכנים או שני המונים בלבד.


שאלות:

72 פשט את הביטויים הבאים :

<p>א. $\frac{4x}{12}$</p>	<p>ב. $\frac{y+1}{2y+2} \cdot \frac{5}{5}$</p>	<p>ג. $\frac{5}{30t^2}$</p>
<p>ד. $\frac{t^2-81}{9t^2}$</p>	<p>ה. $\frac{3y^3-y^2}{25} \cdot \frac{y^2}{3-y}$</p>	<p>ו. $\frac{4x}{x+1} \cdot \frac{8}{x^2+2x+1}$</p>
<p>ז. $\frac{8c^2}{3c^3-9c^2-12c}$</p>	<p>ח. $\frac{t^2-t-20}{16t+8} \cdot \frac{25-t^2}{2t+1}$</p>	<p>ט. $\frac{1}{x} - 4 + \frac{x}{x+1} \cdot \frac{1-3x(x+1)}{5x+5}$</p>

תשובות סופיות:

(1) להלן מערכת הצירים:



- (2) א. 5 ב. -5 ג. 1 ד. -1 ה. -5
- ו. 17 ז. -1 ח. -4
- (3) א. -10 ב. 2 ג. -3 ד. -4 ה. -19 ו. -18
- (4) א. 36 ב. -28 ג. 30 ד. 15 ה. -16
- ו. -40 ז. -18 ח. 18 ט. 18 י. 18
- יא. -18 יב. 36 יג. -16 יד. 16
- (5) א. + ב. + ג. - ד. -
- (6) א. 5 ב. -10 ג. -4 ד. 8 ה. $-\frac{1}{3}$ ו. $-\frac{1}{4}$
- (7) א. -5 ב. -7 ג. -8 ד. 4
- (8) א. 0 ב. 0 ג. 0 ד. לא מוגדר ה. 4 ו. -4
- (9) א. 9 ב. 27 ג. -27 ד. -8 ה. 64 ו. 81
- ז. -125 ח. 10000 ט. -81 י. -625 יא. -64 יב. -64
- (10) א. -3 ב. 5 ג. לא מוגדר ד. -2 ה. -3 ו. -10
- (11) א. 28 ב. 33 ג. 19 ד. -37 ה. 31 ו. -14
- ז. 5 ח. -21 ט. -16 י. -44 יא. 20
- (12) תשובה מודגמת בסרטון.
- (13) א. $\frac{1}{5}$ ב. $\frac{1}{6}$ ג. $\frac{2}{3}$ ד. $\frac{3}{4}$
- (14) א. $\frac{4}{8}, \frac{18}{36}, \frac{40}{80}$ ב. $\frac{30}{50}, \frac{75}{125}, \frac{180}{300}$ ג. $\frac{80}{128}, \frac{160}{256}, \frac{440}{700}$

- א. $\frac{4}{7}$ ב. $\frac{5}{8}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. $\frac{1}{4}$ ה. $\frac{1}{3}$ ו. $\frac{5}{6}$ ז. **(15)**
- א. $-\frac{1}{7}$ ב. $-\frac{4}{6}$ ג. $4\frac{2}{5}$ ד. $2\frac{2}{5}$ ה. $4\frac{3}{4}$ ו. $-6\frac{2}{3}$ ז. **(16)**
- א. $-\frac{21}{8}$ ב. $\frac{47}{4}$ ג. $\frac{25}{4}$ ד. $\frac{9}{2}$ ה. $\frac{23}{6}$ ו. $\frac{5}{3}$ ז. **(17)**
- א. $\frac{13}{20}$ ב. $\frac{38}{125}$ ג. $\frac{17}{50}$ ד. $\frac{7}{1000}$ ה. $\frac{7}{100}$ ו. $\frac{7}{10}$ ז. **(18)**
- א. $5\frac{1}{8}$ ב. $6\frac{3}{100}$ ג. $3\frac{1}{2}$ ד. $1\frac{21}{50}$ ה. $1\frac{1}{50}$ ו. $1\frac{1}{5}$ ז. **(19)**
- א. 0.75 ב. 0.5 ג. 0.023 ד. 0.003 ה. 0.03 ו. 0.3 ז. **(20)**
- א. 0.875 ב. 0.15 ג. 0.14 ד. 0.16 ה. 0.4 ו. 0.5625 ז. **(21)**
- א. $\frac{1}{20}$ ב. $1\frac{1}{5}$ ג. $\frac{4}{5}$ ד. $\frac{16}{25}$ ה. $\frac{8}{25}$ ו. $\frac{1}{4}$ ז. **(22)**
- א. 56% ב. 27.5% ג. 35% ד. 80% ה. 12.5% ו. 75% ז. **(23)**
- א. $2\frac{2}{5}$ ב. 4 ג. $2\frac{2}{5}$ ד. $\frac{8}{45}$ ה. $\frac{5}{21}$ ו. $\frac{9}{20}$ ז. **(24)**
- א. $12\frac{4}{5}$ ב. $\frac{4}{125}$ ג. $\frac{64}{125}$ ד. $8\frac{8}{35}$ ה. $15\frac{2}{5}$ ו. $3\frac{3}{5}$ ז.

- | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| $\frac{5}{18}$.ג | 15 .ה | 36 .ד | $\frac{6}{35}$.ג | 1 $\frac{1}{2}$.ב | 9/10 .א (25) |
| | | | 2 .ט | $\frac{2}{3}$.ח | $\frac{2}{25}$.ז |
| 12 .ג | 20 .ה | 30 .ד | 15 .ג | 4 .ב | 6 .א (26) |
| | | | | 24 .ח | 30 .ז |
| $\frac{1}{9}$.ג | $\frac{1}{2}$.ה | $1\frac{3}{4}$.ד | 1 .ג | $\frac{7}{9}$.ב | $\frac{4}{5}$.א (27) |
| | | $\frac{3}{5}$.ז | $1\frac{5}{8}$.ט | $-\frac{4}{5}$.ח | $-\frac{1}{4}$.ז |
| $3\frac{5}{6}$.ג | 5 .ה | $-\frac{1}{8}$.ד | $\frac{7}{12}$.ג | $\frac{7}{10}$.ב | $1\frac{5}{6}$.א (28) |
| | | | | $-\frac{1}{10}$.ח | $\frac{19}{21}$.ז |
| $-\frac{5}{8}$.ג | $7\frac{11}{12}$.ה | $1\frac{5}{12}$.ד | $3\frac{1}{12}$.ג | $1\frac{1}{6}$.ב | $2\frac{5}{6}$.א (29) |
| | | | | $-\frac{1}{20}$.ח | $2\frac{13}{18}$.ז |
| | $3\frac{5}{18}$.ה | $2\frac{5}{6}$.ד | $-13\frac{3}{4}$.ג | $1\frac{1}{10}$.ב | $2\frac{11}{24}$.א (30) |
| | | | ב. 12 בניים. | | א. 18 בנות. (31) |
| | | | ב. 12 בניים. | | א. 40 תלמידים. (32) |
| | | | ב. 60 ש"ח | | א. 240 ש"ח (33) |
| | | | ב. 40 ש"ח | | א. 540 ש"ח (34) |
| | | | | | 4.9755 ש"ח (35) |
| | | | | | 400 ש"ח (36) |
| 25% .ג | 33.33% .ה | 33.33% .ד | 50% .ג | 60% .ב | 88% .א (37) |
| 5 .ג | -7 .ה | -65 .ד | -12 .ג | 10 .ב | 11 .א (38) |
| | | | | 45 .ח | -10 .ז |
| | | | | $5\frac{22}{27}$.ב | $\frac{10}{27}$.א (39) |

- (40) א. 4 ב. -71 ג. 5 ד. 644 ה. $\frac{1}{2}$
- ו. הצבה ראשונה : 4, הצבה שנייה : 9 ז. -37
- (41) א. 8x ב. $2x^2$ ג. 4xy ד. $-x^2y$ ה. $4a^2 - a$ ו. x^2
- ז. $9xy - 36y$ ח. $8mn^2 - 6nm^2$ ט. $15x^3 - 19$
- י. $-13n - 2m + 6mn$ יא. $-5ab^2 + 22a^2b - 3b$ יב. 0
- יג. $7x^2 - 7x + 2$ יד. $2xy + x + 1$ יה. $4x^2 + 3x - 9$
- יז. $-5x - 5y - 5xy$ יח. $4z^2 - 1$ יט. $14x^2z + 5xz^2 + 6$
- כ. $-3x^2 + 2x - 3$ כא. $7a^2b + 13x^2y$ כב. $-6x^3y - x^2$
- כג. $-8y^2 - 5x^3y^2$ כד. $-8x^2y^3 + 15a^2$ כה. $2a^2b + 3a^2 + 7b$
- כו. $25a^2b - 22ab^2$ כז. $33x^3y^3 - 14x^2y^2 - 3xy^3 - 12x^3y$ כח. $-x^2 - 4y^2 + 4x^2y + 9xy^2 - 7xy$
- (42) א. $6x^2$ ב. $28x^2$ ג. $-24x^2$ ד. $32m^5$ ה. $-6a^5$ ו. $-2b^5$
- ז. $3ab$ ח. $28a^2b^2$ ט. $-2a^3b^2$
- (43) א. $6x - 8$ ב. $-6x^2 + 10x - 2$ ג. $28x - 8$ ד. $-2 + 4x$
- ה. $3a^2 - a$ ו. $b^3 - 3b^2 + 4b$ ז. $10x^2 + 6x$ ח. $5x^3 + 10x^2 - 15x$
- ט. $12t^3 - 3t^4 + 18t^2$ י. $10d^5 - 7.5d^2$
- (44) א. $6x - 6$ ב. $13x - 6$ ג. $-6x + 11$ ד. $x + 9$ ה. $-3x^2 + 33x - 28$
- ו. $10y^2 + 32y - 27$
- (45) א. $x^2 + x - 2$ ב. $x^2 - 4x - 21$ ג. $-x^2 - x + 12$
- ד. $15x^2 + 23x + 4$ ה. $24x^2 - 30x - 9$ ו. $12x^2 - 34x + 10$
- (46) א. $x^2 + 3$ ב. 7 ג. $18m^2 - 6m - 39$ ד. $-3x^5y^3 + 3x^4y^2$
- (47) א. $x^2 + 10x + 25$ ב. $x^2 + 4x + 4$ ג. $16x^2 + 40x + 25$
- ד. $36x^2 + 24x + 4$ ה. $49x^2 + 14xy + y^2$ ו. $25x^2 + 20xy + 4y^2$
- ז. $x^4 + 14x^2 + 49$ ח. $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ ט. $x^6 + 4x^4y^2 + 4y^4x^2$

$25 - 10x + x^2$.ג	$x^2 - 4x + 4$.ב	$x^2 - 12x + 36$.א (48)
$\frac{1}{9}x^2 - 3\frac{1}{3}x + 25$.ו	$9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$.ה	$36x^2 - 12x + 1$.ד
$x^4y^4 - 14x^2y^2 + 49$.ט	$x^4 - \frac{6}{5}x^2y + \frac{9}{25}y^2$.ח	$9m^2 - 12mn + 4n^2$.ז
$25 - 49x^2$.ז	$9x^2 - 1$.ג	$x^2 - 9$.ב
$9a^4b^6 - 16$.ח	$x^4 - y^2$.ו	$x^2 - 25$.א (49)
$-4x^2 - x$.ג	$25y^2 - \frac{1}{16}x^2$.ו	$\frac{1}{4}x^2 - 36$.ה
$-10x^2 + 17x + 321$.ו	$5x^2 - 24x + 13$.ב	$x^2 + 2$.א (50)
$4(5 - 2a)$.ג	$-6x^2 - 39x - 16$.ה	$18x^2 - 6xy$.ד
$8(5a^2 - b^2 + 8c^2)$.ו	$2(3y - 2)$.ב	$3(x - 4)$.א (51)
$y(6y + 5y^2 + 4)$.ג	$5(15m^2 + 5m + 3)$.ה	$4(a^3 + 2b)$.ד
$x(3 - 11x^2)$.ב	$y(y + 5)$.א (52)	$a^3\left(\frac{1}{2}a^4 - \frac{1}{4}a^2 + 1\right)$.ד
$5n(n^2 - 4n + 10)$.ג	$3t(t + 4)$.ב	$2x(x - 4)$.א (53)
$3mn(9 - n + 3n^2)$.ו	$4xy(xy + 4x - 5y)$.ה	$2y^2(4 + 3y - y^2)$.ד
$(y - 11)^2$.ז	$(y - 9)^2$.ג	$(x + 6)^2$.ב
$(5x + 7)^2$.ח	$(3x - 4)^2$.ו	$(x + 5)^2$.א (54)
$(5y + 7)(5y - 7)$.ג	$(4y - 1)^2$.ו	$(2x + 1)^2$.ה
$(5y + 7)(5y - 7)$.ג	$(x + 9)(x - 9)$.ב	$(r + 5)(r - 5)$.א (55)
$(3y^2 + 13x^2)(3y^2 - 13x^2)$.ו	$(xy + 2)(xy - 2)$.ה	$(11x + 1)(11x - 1)$.ד
$(m^2 + 1)(m + 1)(m - 1)$.ג	$x(x - 5)^2$.ב	$y(1 + y)(1 - y)$.א (56)
$(x - 2)(x - 31)$.ג	$x^2(14x - 5)^2$.ד	$(x + 1)(x + 4)$.א (57)
$(3x + 1)(2x + 1)$.ו	$(x - 3)(x - 5)$.ב	$(2x - 3)(x + 5)$.ד
$(3x - 2)(x - 3)$.ה	$(x - 9)^2$.ח	$(x + 2)(2x - 3)$.ז
ט. אין פירוק.		

58) א. $6\left(x+\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)$ ב. $(x+1)(x+4)$ ג. $(2x+5)^2$ ד. אין פירוק.

59) א. $x \neq -3$ ב. $x \neq 6$ ג. $x \neq 4$ ד. $x \neq 0, x \neq 4$
ה. $x \neq -1$ ו. $x \neq -2, x \neq 2$ ז. $y \neq 0, y \neq -1, y \neq 1$ ח. $x \neq 0, x \neq 1, x \neq 4$

60) א. x ב. לא ניתן לצמצם ג. $1-x$ ד. לא ניתן לצמצם ה. לא ניתן לצמצם
ו. $\frac{x}{y}$ ז. $\frac{x}{y}$ ח. לא ניתן לצמצם ט. $4x$ י. לא ניתן לצמצם

61) א. $3, x \neq -4$ ב. $\frac{m}{4}, m \neq -4$ ג. $\frac{2}{a}, a \neq 0, 6$

ד. $-\frac{x}{3}, x \neq 5$ ה. $-3, y \neq \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$ ו. $\frac{2x^2}{3}, x \neq \frac{1}{2}$

ז. $\frac{3}{y(y-3)}, y \neq 0, 3$ ח. $\frac{3z^2-12z+4}{z+5}, z \neq 0, -5$

62) א. $\frac{x+5}{2}, x \neq -5$ ב. $\frac{n}{8-n}, n \neq 8$ ג. $\frac{z^2}{2(z-4)}, z \neq 4$

ד. $\frac{2m+5}{2m}, m \neq 0, -\frac{5}{2}$ ה. $\frac{2(2-3y)}{y}, y \neq 0, \frac{2}{3}$ ו. $\frac{a(a+2b)}{3b}, b \neq 0, a \neq -2b$

63) א. $\frac{1}{x-5}, x \neq 5, -2$ ב. $m-8, m \neq 4$ ג. $\frac{2}{y+3}, x \neq -3, \frac{5}{2}$

ד. $z+8, z \neq -\frac{2}{3}$ ה. $\frac{x-4}{x^2}, x \neq 0, -9$ ו. $\frac{-3n}{2n+1}, n \neq -\frac{1}{2}, \frac{4}{3}$

ז. $\frac{x+2}{x+3}, x \neq -2, -3$ ח. $\frac{x-7}{x+8}, x \neq 7, -8$

ט. $\frac{3a-b}{a(2b-3a)}, a \neq 0, b \neq 0, a \neq 3b, 2b \neq 3a$ י. $\frac{m(m-n)}{n(2mn+3)}, mn \neq 1, -\frac{3}{2}, n \neq 0$

64) א. $\frac{x^2}{24}$ ב. $\frac{3}{x}$ ג. $\frac{35}{y}$ ד. $\frac{9x}{20}$ ה. $\frac{2x}{3}$

ו. $4(a-5)$ ז. $\frac{w(w-3)}{2}$ ח. $\frac{y^2-16}{2y^2+32}$ ט. $\frac{z+15}{z-5}$ י. $\frac{10n(n+11)(n+2)}{n-11}$

$$\frac{1}{3} \text{ .א} \quad d^2 \text{ .ב} \quad \frac{5}{6a^3} \text{ .ג} \quad 6a^3 \text{ .ד} \quad \frac{y^2}{125} \text{ .ה} \quad \frac{3}{4} \text{ .ו (65)}$$

$$\frac{a-8}{a-6} \text{ .ב} \quad \frac{7(y+4)}{8(y-4)} \text{ .ג}$$

$$1 \text{ .א} \quad \frac{5x+1}{x+1} \text{ .ב} \quad \frac{4x+8}{x} \text{ .ג} \quad \frac{2a-5}{6} \text{ .ד (66)}$$

$$\frac{c^2d - a^2d^2 + 2ab^2}{abcd} \text{ .א} \quad \frac{z+5x+4y}{xyz} \text{ .ב} \quad \frac{c-5a}{abc} \text{ .ג (67)}$$

$$\frac{1}{(z-2)(z-3)} \text{ .א} \quad \frac{3y+4}{(y+1)^2} \text{ .ב} \quad \frac{-5y^2+x+1}{xy^2} \text{ .ג}$$

$$\frac{2x+4}{x+1} \text{ .א} \quad \frac{y^2+3}{y^2} \text{ .ב} \quad \frac{x-2}{x} \text{ .ג (68)}$$

$$\frac{4x^2y+12z^2+9y^2-3y^3-126xy^2z}{36xy^2z} \text{ .א} \quad \frac{-11a^2+a+4}{4a^2} \text{ .ב} \quad \frac{9x-2}{3x} \text{ .ג}$$

$$\frac{a^2+4a+6}{a(a+2)} \text{ .א} \quad \frac{y-6}{y(y+2)} \text{ .ב} \quad \frac{4x+1}{x(x+1)} \text{ .ג (69)}$$

$$-\frac{4z+21}{3z(z+3)} \text{ .א}$$

$$\frac{2y(4-y)}{(y-2)^2(y+2)} \text{ .א} \quad \frac{5x+4}{(x-4)(x+4)^2} \text{ .ב} \quad \frac{4}{a-3} \text{ .ג (70)}$$

$$\frac{4(a^2+6a+6)}{(a+7)^2(2a+1)} \text{ .א} \quad \frac{x^2-6x-13}{(x+8)(x-5)(x-3)} \text{ .ב} \quad \frac{(4z+3)(z-1)}{2(z+1)^2(z+3)} \text{ .ג}$$

$$\frac{3}{a+2b} \text{ .א} \quad \frac{x-3}{x-5} \text{ .ב}$$

$$\frac{1}{3(10x+1)} \text{ .א} \quad \frac{1}{2} \text{ .ב} \quad \frac{147y^2-594y+8}{126(y-4)} \text{ .ג} \quad \frac{x}{7} \text{ .ד} \quad \frac{x+1}{2} \text{ .ה (71)}$$

$$\frac{(3y-1)(3-y)}{25} \text{ .א} \quad \frac{t-9}{54t^2} \text{ .ב} \quad \frac{1}{6t^3} \text{ .ג} \quad 2.5 \text{ .ד} \quad \frac{x^2}{3} \text{ .ה (72)}$$

$$\frac{5}{x} \text{ .א} \quad \frac{t+4}{-8(t+5)} \text{ .ב} \quad \frac{c}{c-4} \text{ .ג} \quad \frac{x(x+1)}{2} \text{ .ד}$$